

MESURES SANITAIRES LIÉES À LA COVID-19

LABORATOIRES PROGRAMME D'AUDIOLOGIE

Adaptation avec permission des documents suivants

Messier, K., Hanssens, J.-M. & Tousignant, B. (2020). *Guide d'application des mesures sanitaires à la Clinique universitaire de la vision*. École d'optométrie, Université de Montréal

Tousignant, B. (2020). *Recommandations – Reprise des activités professionnelles dans les cabinets d'optométristes et d'opticiens d'ordonnances en contexte de pandémie COVID-19*. Ordre des optométristes du Québec et Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec. Tiré de https://www.ooq.org/sites/default/files/2020-05/Recommandations%20OOQ%20COVID-19%20reprise%20activite%CC%81s_20200528-Final-v2.pdf

Table des matières

CONTEXTE ET OBJECTIFS	5
1. MESURES GÉNÉRALES	6
1.1. Procédure de déclaration et de surveillance – COVID-19	6
1.2. Adaptation pour le déroulement des activités en laboratoire	6
2. MESURES ASSOCIÉES AUX PROCÉDURES D'APPRENTISSAGE DANS LES LABORATOIRES	8
2.1. Mesures générales	8
2.2. Mesures spécifiques	9
OUVRAGES CONSULTÉS	10
ANNEXES	i
ANNEXE 1 – AFFICHES HYGIÈNE DES MAINS	ii
ANNEXE 2 – COMMENT METTRE UN MASQUE	iii
ANNEXE 3 – MASQUES, GANTS, BLOUSES ET PROTECTION OCULAIRE	v
(ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL) – POSE/RETRAIT	v
ANNEXE 4 – ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE	vi
ANNEXE 5 – FICHES RELATIVES AUX ACTIVITÉS MENÉES DANS LES LABORATOIRES	vii
FICHE 1 – CUEILLETTE ET TRANSMISSION D'INFORMATION	
FICHE 2 – OTOSCOPIE	
FICHE 3 – VIDÉO-OTOSCOPIE	
FICHE 4 – TYMPANOMÉTRIE	
FICHE 5 – GESTION DU CÉRUMEN	
FICHE 6 – MESURE DES RÉFLEXES ACOUSTIQUES	
FICHE 7 – EXAMENS TONAUX	
FICHE 8 – EXAMENS VOCAUX	
FICHE 9 – MESURES DES ÉMISSIONS OTOACOUSTIQUES	
FICHE 10 – MESURES ÉLECTROPHYSIOLOGIQUES	
FICHE 11 – PRISE D'EMPREINTES DU CONDUIT AUDITIF EXTERNE (C.A.E.)	
FICHE 12 – TEST D'ÉCOUTE D'UNE AIDE AUDITIVE	
FICHE 13 – MESURES IN-SITU D'UNE AIDE AUDITIVE	
FICHE 14 – EXPERTISE ÉLECTROACOUSTIQUE DES APPAREILS AUDITIFS	
FICHE 15 – EXAMEN VIDEONYSTAGMOGRAPHY (VNG)	
FICHE 16 – EXAMEN VIDEO HEAD IMPULSE TEST (vHIT)	
FICHE 17 – EXAMEN VESTIBULAR EVOKED MYOGENIC (VEMP)	
FICHE 18 – ÉVALUATION VESTIBULAIRE AU CHEVET	

FICHE 19 – TESTS AU VPPB

FICHE 20 – MÉTHODES DE RÉADAPTATION VESTIBULAIRE

FICHE 21 – ÉVALUATION AUDIOLOGIQUE D'ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE

CONTEXTE ET OBJECTIFS

La situation actuelle de pandémie à la COVID-19 exige plusieurs aménagements dans les laboratoires en audiologie afin d'éviter la propagation du virus et protéger la santé des intervenants et des étudiants.

Les mesures sanitaires énumérées dans ce document visent à atténuer le risque de contagion à la COVID-19 et permettre la tenue des activités pratiques dans les laboratoires en audiologie.

Ce document constitue une synthèse des meilleures pratiques au moment de sa rédaction et s'appuie sur des recommandations de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Il a été produit par des membres de l'École d'orthophonie et d'audiologie (ÉOA), encadrés par des conseillers du bureau de prévention et de la sécurité – santé au travail de l'Université de Montréal. Les directives écrites dans ce document pourraient être modifiées selon l'avancement des connaissances concernant la propagation du coronavirus.

Les étudiants doivent obligatoirement connaître l'ensemble des recommandations et mesures sanitaires nécessaires au déroulement des activités pratiques ayant lieu dans les locaux de l'ÉOA de l'Université de Montréal.

La structure du document est adaptée de celui publié par [l'Ordre des optométristes du Québec](#) avec leur permission.

Membres du comité de rédaction et de la recherche

Benoît Jutras, Ph.D., Professeur titulaire, Directeur de programme en audiologie
Ronald Choquette, M.O.A., AU(D), Professeur agrégé de clinique
Anne-Marie Hurteau, M.O.A., Coordinatrice de la formation clinique en audiologie
Louise Boulanger, M.O.A., Coordinatrice de la clinique universitaire d'orthophonie et d'audiologie

Membres du comité de prévention et contrôle des infections

Nancy Persico

Membres de l'ÉOA ayant collaboré à la production de ce document

Natacha Trudeau, Ph.D., Professeure titulaire, Directrice de l'École d'orthophonie et d'audiologie
Maxime Maheu, Ph.D., Professeur adjoint

Autres membres de l'ÉOA ayant été consultés

Adrian Fuente, Ph.D., Professeur agrégé

1. MESURES GÉNÉRALES

Les activités de laboratoire en audiologie à l'École d'orthophonie et d'audiologie (ÉOA) de l'Université de Montréal se feront dans le respect des recommandations de contrôle et de prévention des infections de l'Université de Montréal.

Les étudiants et les personnes impliquées dans l'organisation et le déroulement des laboratoires recevront une formation concernant la prévention, le contrôle des infections et l'utilisation des équipements de protection individuels.

1.1. Procédure de déclaration et de surveillance – COVID-19

- Les étudiants ne devront pas se présenter à l'ÉOA en présence de symptômes associés à la [COVID-19](#). Ils doivent informer par courriel le professeur responsable du cours, le directeur du programme d'audiologie ainsi que Stéphanie Dionne (stephanie.dionne@umontreal.ca), adjointe à la directrice de l'ÉOA.
- À leur arrivée à l'étage de l'École (3^e étage du pavillon 7077, avenue du Parc) par l'escalier unidirectionnel, les étudiants devront se présenter à la table de contrôle, située près du secrétariat de l'ÉOA afin de signer le **registre de présence** en plus d'y inscrire la date, l'heure d'arrivée et l'heure du départ ainsi que d'indiquer s'ils ont fait l'autoévaluation des symptômes de la COVID-19 avant de se présenter à l'ÉOA et qu'ils n'en ont pas. Les étudiants rapportant aucun symptôme relié à la COVID-19 sont admis à l'ÉOA pour les activités prévues. **Les étudiants ayant des symptômes associés à la COVID-19 pendant le laboratoire, ils devront quitter l'Université et retourner à leur domicile. De là, ils devront appeler la ligne téléphonique de gouvernement du Québec (514 644-4545, 1 877 644-4545 (sans frais) ou 1 800 361-9596 (sans frais) pour les personnes malentendantes utilisant un appareil de télécommunication pour sourds (ATS) du lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h.** Cette ligne est dédiée aux questions relatives à la COVID-19. Les étudiants seront dirigés vers les ressources adéquates, le cas échéant.
- Les étudiants admis à l'ÉOA devront :
 1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
 2. Aller à leur casier pour récupérer leurs équipements de protection individuels et y déposer leurs effets personnels.
 3. N'apporter que le matériel nécessaire au déroulement du laboratoire.
 4. Se rendre à l'entrée du local où aura lieu le laboratoire.
 5. Se laver les mains selon la procédure apprise.
 6. Mettre le masque avec fenêtre ou masque de procédure selon la procédure apprise.
 7. Désinfecter la visière faciale ou les lunettes de protection avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
 8. Se laver les mains selon la procédure apprise avant d'entrer dans le laboratoire.

1.2. Adaptation pour le déroulement des activités en laboratoire

- Le nombre d'étudiants présents dans chaque laboratoire sera réduit à deux ou trois à moins que le local permette de respecter la distanciation physique de deux mètres entre les équipes de deux ou trois étudiants.
- L'horaire sera organisé de façon à ce que le début des laboratoires soit décalé d'un groupe de deux ou trois étudiants à l'autre afin de réduire l'affluence dans les couloirs.

- L'horaire est aussi organisé pour que les étudiants ne soient présents que des demi-journées, lorsque c'est possible.
- Des affiches concernant l'hygiène des mains, l'étiquette respiratoire, la pose et le retrait du masque, des gants et de la protection oculaire ainsi que les protocoles de désinfection généraux ou spécifiques à l'instrumentation seront installés dans locaux, à des endroits stratégiques. Ces affiches se trouvent plus bas et en annexes.
- Près de la porte et à l'intérieur de chaque local des laboratoires, une station pour effectuer l'hygiène des mains sera installée.
- Les étudiants et le personnel enseignant devront réduire leurs déplacements dans les couloirs de l'ÉOA.
- Les déplacements à la droite des couloirs seront encouragés pour réduire toute possibilité de contact ou rencontre.
- Les étudiants se verront attribuer un casier pour déposer leurs effets personnels ainsi que les équipements de protection individuels (ÉPI) réutilisables.

2. MESURES ASSOCIÉES AUX PROCÉDURES D'APPRENTISSAGE DANS LES LABORATOIRES

Les étudiants apprennent les procédures s'appliquant aux mesures auditives ou vestibulaires. Ils seront répartis dans de petites équipes de deux ou trois et devront à tour de rôle appliquer ces procédures à leur collègue de leur équipe. Ces procédures impliquent que les étudiants sont souvent à proximité les uns des autres pour effectuer les tâches. Nous prévoyons donc des mesures sanitaires pour des situations où la distanciation de deux mètres n'est pas respectée.

Dans les sections suivantes, nous présentons les mesures sanitaires générales qui sont transversales aux diverses tâches et des mesures sanitaires spécifiques à chaque tâche.

2.1. Mesures générales

- Se procurer des masques de procédure ou masques avec fenêtre selon les indications en vigueur et une protection oculaire. Des masques de procédure et protection oculaire seront fournis par l'ÉOA, au besoin.
 - Les étudiants peuvent se procurer les ÉPI à la librairie de l'Université de Montréal
 - Les étudiants doivent mettre les ÉPI avant d'entrer dans le local où se déroulent les laboratoires.
 - Le même masque avec fenêtre ou le masque de procédure peut être porté plus d'une fois en respectant les procédures pour mettre et enlever le masque. Lorsqu'il est enlevé, il doit être déposé sur un crochet prévu à cet effet.
 - Le même masque avec fenêtre ou masque de procédure doit être porté pour une durée maximale de quatre heures. Le masque doit être changé avant cette période s'il est souillé, endommagé ou que la respiration devient difficile.
 - Le masque avec fenêtre qui a été porté au cours d'une journée doit être lavé à l'eau savonneuse avant d'être porté une autre journée. Il doit être mis dans un sac en plastique pour l'emporter à la maison.
 - Le masque de procédure doit être jeté à la poubelle.
 - Durant le transport, le masque n'ayant pas été porté doit être mis dans un autre sac de plastique que celui destiné au masque souillé.
 - La protection oculaire recommandée est une paire de lunettes protectrices ou une visière faciale amovible, qui se relève à 180 degrés, attachée à un support ajustable à la tête. Ce type de visière facilite l'exécution de certaines tâches, comme l'otoscopie.
- Procéder à l'hygiène des mains en se les lavant ou en utilisant une solution contenant de l'éthanol à 70%
 - En entrant dans un local
 - En sortant d'un local
 - Avant de mettre ou d'enlever le masque avec fenêtre ou de procédure
 - Avant de mettre ou d'enlever la protection oculaire
 - Avant de mettre ou d'enlever une blouse de protection, le cas échéant
 - Avant de mettre ou d'enlever les gants de protection, le cas échéant
- Désinfecter
 - Les surfaces touchées par les étudiants

- Les protections oculaires qui furent prêtées par l'ÉOA
 - Les équipements utilisés avant et après leur utilisation
- Jeter dans une poubelle prévue à cet effet
 - Les gants
 - Les blouses de protection à usage unique, le cas échéant
 - Tout matériel utilisé lors du laboratoire qui est à usage unique, comme les bouchons d'immitancemétrie, les embouts pour écouteurs intra-auriculaires, etc.

2.2. Mesures spécifiques

Des fiches ont été créées pour chaque procédure d'apprentissage dans les laboratoires. Elles ont été conçues pour informer les étudiants sur les ÉPI à utiliser ainsi que sur les mesures qu'ils doivent appliquer avant, pendant et après les laboratoires. Nous avons ajouté les fiches détaillées dans l'annexe 6.

OUVRAGES CONSULTÉS


1. Gouvernement du Québec (2020). *Information générale sur la maladie à coronavirus (COVID-19)*. <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/>
2. Institut national de santé publique du Québec (2020). *Prévention et contrôle des infections*. <https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-contrôle-des-infections>
3. Messier, K., Hanssens, J.-M. & Tousignant, B. (2020). *Guide d'application des mesures sanitaires à la Clinique universitaire de la vision*. École d'optométrie, Université de Montréal
4. Tousignant, B. (2020). *Recommandations – Reprise des activités professionnelles dans les cabinets d'optométristes et d'opticiens d'ordonnances en contexte de pandémie COVID-19*. Ordre des optométristes du Québec et Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec. https://www.ooq.org/sites/default/files/2020-05/Recommandations%20OOQ%20COVID-19%20reprise%20activite%CC%81s_20200528-Final-v2.pdf

ANNEXES

ANNEXE 1 – AFFICHES HYGIÈNE DES MAINS

Friction hydro-alcoolique – Comment ?


AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE



Remplir la paume d'une main avec le produit hydro-alcoolique, recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :



Paume contre paume par mouvement de rotation,



le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite, et vice versa,



les espaces interdigitaux paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière,



les dos des doigts en les tenant dans la paume des mains, opposées avec un mouvement d'aller-retour latéral,



le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite, et vice versa,



la pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche, et vice versa.



Rincer les mains à l'eau,



sécher soigneusement les mains avec une serviette à usage unique,



fermer le robinet à l'aide de la serviette.



20-30 secondes



Une fois sèches, les mains sont prêtes pour le soin.



40-60 secondes



Les mains sont prêtes pour le soin.

WORLD ALLIANCE
for PATIENT SAFETY

L'OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs du service de Prévention et Contrôle de l'infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.

Octobre 2006, version 1.



Organisation mondiale de la Santé

Toutes les précautions ont été prises par l'OMS pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d'aucune sorte. L'interprétation et l'utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L'OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.

Design: mondekigo.com

Tiré de : https://www.who.int/gpsc/tools/friction_lavage.pdf?ua=1

ANNEXE 2 – COMMENT METTRE UN MASQUE

PROTÉGEZ LA SANTÉ DES AUTRES !

Comment mettre un masque



1

Mettez le masque en plaçant
le bord rigide vers le haut.



2

Moulez le bord rigide du
masque sur le nez.



3

Abaissez le bas du masque
sous le menton.

CHANGEZ LE MASQUE LORSQU'IL EST MOUILLÉ.

Québec.ca

Votre
gouvernement

Québec

19-207-0994 © Gouvernement du Québec, 2020

<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-09F.pdf>


COMMENT METTRE ET ENLEVER UN MASQUE

MASQUE DE PROCÉDURE

Comment le mettre et le retirer


COMMENT METTRE LE MASQUE

1. SE LAVER les mains avant de prendre un masque
2. PASSER les courroies derrière les oreilles
3. DÉPLIER le masque du nez jusqu'au menton
4. S'ASSURER que le masque adhère aux joues
5. MODELER la pince nasale à la forme du nez



COMMENT RETIRER LE MASQUE


1. SE LAVER LES MAINS puis retirer le masque en saisissant les courroies
2. SE RELAXER LES MAINS après avoir retiré le masque



ATTENTION !



NE PAS
TOUCHER
le masque



NE PAS
RETIRER
le masque
pour parler
avec une
autre
personne

CHANGER DE MASQUE

- LORSQU'IL EST SOUILLÉ
- LORSQU'IL EST HUMIDE ET INCONFORTABLE
- SELON LES RECOMMANDATIONS DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

ANNEXE 3 – MASQUES, GANTS, BLOUSES ET PROTECTION OCULAIRE (ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL) – POSE/RETRAIT

PRÉVENTION DES INFECTIONS


ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS (ÉPI)

Pour certains pathogènes, les ÉPI peuvent être augmentés et la procédure revue.

ÉTAPES POUR METTRE LES ÉPI

PRÉPARATION ➤ S'assurer que les ÉPI sont sans défauts et de la bonne taille.
➤ Enlever les bijoux, attacher les cheveux longs.

PROCÉDER À L'HYGIÈNE DES MAINS



1 BLOUSE

➤ Enfiler la blouse, l'attacher au cou et à la taille.



2 MASQUE — OU — APR

➤ Placer un masque ou un masque avec visière sur le visage en couvrant le nez et le menton, et l'attacher.



➤ Modeler la pince nasale à la forme du nez.



➤ Prendre un appareil de protection respiratoire (APR) dans le creux de la main en laissant pendre les courroies.



➤ Placer l'APR pour couvrir le menton et le nez.



➤ Passer la courroie supérieure et la placer sur le dessus de la tête; passer la courroie inférieure et la placer autour du cou, sous les cheveux.



➤ S'il y a une pince nasale, la modeler à la forme du nez et vérifier l'étanchéité de l'APR.



3 PROTECTION OCULAIRE

➤ Mettre les lunettes ou la visière.



4 GANTS

➤ Mettre les gants, couvrir les poignets de la blouse.



ÉTAPES POUR RETIRER LES ÉPI

1 GANTS

- Pour retirer les gants, saisir la surface extérieure d'un des gants en le pinçant au haut de la paume.
- Écarter le gant de la paume en le tirant vers les doigts et le retourner sur lui-même.
- Le chiffonner en boule et le garder dans la main gantée.
- Glisser l'index et le majeur nus sous la bande de l'autre gant sans toucher l'extérieur.
- Écarter le gant de la paume en le tirant vers les doigts et le retourner sur lui-même. L'étirer pour que le premier gant entre dedans. Puis jeter les gants dans le contenant approprié.



PROCÉDER À L'HYGIÈNE DES MAINS

2 BLOUSE

- Détacher la blouse sans se contaminer.
- Saisir la base des attaches du cou et ramener la blouse vers l'avant.
- Saisir l'intérieur de la manche opposée, la faire glisser sans la retourner pour dégager la main.
- Avec la main dégagée, procéder de la même façon pour retirer l'autre manche.
- Rouler la blouse en boule en évitant de toucher l'extérieur.
- Jeter dans le contenant approprié.



PROCÉDER À L'HYGIÈNE DES MAINS

3 PROTECTION OCULAIRE

- Pour retirer les lunettes ou la visière, manipuler l'équipement par les côtés ou l'arrière en évitant de toucher le devant. Jeter dans le contenant approprié.



4 MASQUE — OU — APR

- Pour retirer le masque, détacher les attaches du bas et celles du haut (ou saisir les élastiques).
- Tirer le masque vers l'avant à l'aide des attaches en évitant de toucher l'extérieur.
- Jeter dans le contenant approprié.



PROCÉDER À L'HYGIÈNE DES MAINS ET SORTIR DE LA PIÈCE

- Pour retirer l'APR, pencher la tête légèrement vers l'avant, passer la courroie inférieure par-dessus la tête puis la courroie supérieure en évitant de toucher le filtre.
- Jeter dans le contenant approprié.



PROCÉDER À L'HYGIÈNE DES MAINS

Tiré de : <http://asstas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf>

Tiré de : <https://vimeo.com/399025696>

ANNEXE 4 – ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE

PROTÉGEZ LA SANTÉ DES AUTRES !

Tousser ou éternuer sans contaminer



1

Couvrez votre bouche et votre nez avec un mouchoir de papier lorsque vous toussiez ou éternuez.



2

Jetez le mouchoir de papier à la poubelle.



3

Si vous n'avez pas de mouchoir de papier, toussiez ou éternuez dans le pli de votre coude ou le haut de votre bras.



4

Lavez-vous les mains souvent. Si vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon, utilisez un produit antiseptique.

SI VOUS ÊTES MALADE, ÉVITEZ DE RENDRE VISITE À VOS PROCHES.

Québec.ca

Votre
gouvernement

Québec

19-207-01F, © Gouvernement du Québec, 2019

Tiré de : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf>

ANNEXE 5

**FICHES RELATIVES AUX ACTIVITÉS MENÉES
DANS LES LABORATOIRES D'AUDIOLOGIE**

FICHE 1

CUEILLETTE ET TRANSMISSION D'INFORMATION

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtré ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Avant la rencontre

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Désinfecter les surfaces où la personne sera assise (chaise et table) avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
3. Mettre un masque et une protection oculaire si la distanciation physique de deux mètres ne peut être respectée ou si un panneau de plexiglass ne peut être installé entre l'intervenant et la personne.

Pendant la rencontre

1. Demander à la personne de se laver les mains selon la procédure.
2. Demander à la personne de s'asseoir à l'endroit désigné.
3. Ne pas remettre de dépliant ou de feuille à la personne. L'information pourra être transmise par courriel ou par courrier.
4. Si un formulaire devrait être signé, désinfecter un crayon à l'encre avant de le remettre à la personne pour qu'elle puisse signer le formulaire. Une fois le formulaire signé, demander à la personne de déposer le formulaire et le crayon sur la table.
5. Récupérer le formulaire et le crayon pour les déposer.
6. Demander à la personne de se laver les mains selon la procédure.
7. Se laver les mains selon la procédure apprise.

Après la rencontre

Si vous continuez avec une autre étape de l'intervention

1. Désinfecter les surfaces touchées par la personne testée (surface de la table, chaise, accoudoirs, poignée de porte, etc.) ou par vous avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
2. Mettre des gants et désinfecter le crayon (si la personne l'a touché) et l'espace de travail (clavier, souris) avec un lingette désinfectante à au moins 70% d'éthanol et laisser sécher.
3. Se laver les mains selon la procédure.
4. Accompagner la personne vers l'autre équipement ou l'autre pièce
5. Procéder à la prochaine intervention selon les directives inscrites sur la fiche propre à cette intervention.

Si la tâche est terminée et que la personne quitte les lieux

1. Désinfecter les surfaces ayant été touchées par la personne testée (surface de la table, chaise, accoudoirs, poignée de porte, etc.) ou par vous avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
2. Mettre des gants et désinfecter l'espace de travail (clavier, souris) avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol et laisser sécher.
3. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
4. Se laver les mains selon la procédure.
5. Enlever la protection faciale selon la procédure apprise.
6. Désinfecter la protection faciale avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec pulvérisateur et laisser sécher.
7. Se laver les mains selon la procédure apprise.
8. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
9. Se laver les mains selon la procédure apprise.
10. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 2 OTOSCOPIE

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Mettre les équipements de protection individuels requis selon la procédure apprise.
3. Mettre des gants et désinfecter l'otoscope avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
4. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
5. Se laver les mains selon la procédure apprise

Pendant l'examen

1. Mettre des gants et désinfecter la pincette à l'aide d'une lingette alcoolisée à au moins 70%.
2. Prendre un spéculum à l'aide d'un papier mouchoir.
3. Attacher un spéculum sur l'otoscope.
4. Désinfecter le spéculum avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
5. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
6. Se laver les mains selon la procédure apprise
7. Faire l'examen des deux conduits auditifs externes (C.A.E.).
8. Détacher le spéculum à l'aide d'un papier mouchoir et jeter dans une poubelle prévue à cet effet.

Notes :

- a. En présence d'un écoulement visible ou perçu après l'examen dans l'un des C.A.E. ou un écoulement récent rapporté par la personne, appliquer la procédure décrite plus haut, en commençant par examiner le C.A.E. de l'oreille sans écoulement et par la suite, examiner la deuxième oreille avec écoulement.
- b. Si l'écoulement est visible aux deux oreilles détacher et jeter le spéculum après l'examen du premier C.A.E. et attacher un nouveau spéculum et examiner l'autre C.A.E.

Après l'examen

1. Mettre des gants et désinfecter le manche de l'otoscope avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
2. Retirer les gants selon la procédure apprise
3. Se laver les mains selon la procédure apprise.
4. Retirer la protection faciale selon la procédure apprise
5. Procéder à l'hygiène des mains selon la procédure apprise

5. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
6. Se laver les mains selon la procédure apprise.
7. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 3 VIDÉO-OTOSCOPIE

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédures

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Mettre les équipements de protection individuels requis selon la procédure apprise.
3. Mettre des gants et désinfecter le manche du vidéo-otoscope avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
4. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
5. Se laver les mains selon la procédure apprise

Pendant l'examen

1. Attacher un spéculum sur le manche du vidéo-otoscope.
2. Faire l'examen des deux conduits auditifs externes (C.A.E.).
3. Détacher le spéculum à l'aide d'un papier mouchoir et jeter le spéculum et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.

Notes :

- a. En présence d'un écoulement visible ou perçu après l'examen dans l'un des C.A.E. ou un écoulement récent rapporté par la personne, appliquer la procédure décrite plus haut, en commençant par examiner le C.A.E. de l'oreille sans écoulement et par la suite, examiner la deuxième oreille avec écoulement.
- b. Si l'écoulement est visible aux deux oreilles détacher et jeter le spéculum après l'examen du premier C.A.E. et attacher un nouveau spéculum et examiner l'autre C.A.E.

Après l'examen

1. Mettre des gants et désinfecter le manche du vidéo-otoscope avec lingette alcoolisée à au moins 70%.
2. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
3. Se laver les mains selon la procédure apprise.
4. Retirer la protection faciale.
5. Se laver les mains selon la procédure apprise.
6. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
7. Se laver les mains selon la procédure apprise.
8. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 4 TYMPANOMÉTRIE

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure enseignée.
2. Mettre les équipements de protection individuels requis en suivant la procédure.

Pendant l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante.
2. Mettre des gants et désinfecter la pincette permettant de prendre les embouts pour le test avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
3. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
4. Prendre un embout avec la pincette dans le coffret.
5. Déposer la pincette sur une lingette.
6. Placer l'embout sur la sonde.
7. Insérer l'embout dans un des conduits auditifs externes (C.A.E.) de la personne.
8. Faire la tympanométrie à cette oreille.
9. Faire la mesure à l'autre oreille.
10. Enlever l'embout à l'aide d'un papier mouchoir et jeter l'embout et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.

IMPORTANT

En présence d'un écoulement visible dans l'un ou les deux C.A.E. ou un écoulement récent rapporté par la personne testée,

1. Après avoir fait le test d'un côté, détacher l'embout avec un papier mouchoir et jeter l'embout et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.
2. Choisir un autre embout, selon la procédure décrite plus haut.
3. Mettre cet embout sur la sonde.
4. Refaire le test de l'autre côté.
5. Détacher l'embout avec un papier mouchoir et jeter l'embout et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.

Après l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
2. Mettre des gants et désinfecter la sonde et le tympanomètre avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
3. Désinfecter les surfaces touchées par la personne avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.

4. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
5. Se laver les mains selon la procédure apprise.
6. Retirer la protection faciale.
7. Désinfecter la protection faciale avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.
8. Se laver les mains selon la procédure apprise.
9. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
10. Se laver les mains selon la procédure apprise.
11. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 5

GESTION DU CÉRUMEN

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Mettre les équipements de protection requis en suivant la procédure apprise.

Pendant l'examen

Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante.

Méthode mécanique

1. Prenez les curettes déjà stérilisées à froid.
2. Placer un carré de gaze sur l'épaule du patient pour y déposer le cérumen.

Méthode par aspiration

1. Prenez les buses déjà stérilisées à froid.
2. Faire l'aspiration du cérumen.

Méthode par irrigation

1. Placer sur le patient une couverture de plastique recouvrant les épaules et le torse.
2. Placer un bassin sous l'oreille à nettoyer pour recueillir l'eau souillée.
3. Placer un embout d'irrigation jetable sur le tube d'irrigation.
4. Désinfecter l'embout avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
5. Entrer l'embout dans le conduit auditif externe et procéder à l'exérèse.
6. Après exérèse, enlever et jeter l'embout d'irrigation dans une poubelle prévue à cet effet.
7. Jeter l'eau dans la cuvette prévue à cet effet et nettoyer le bassin avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec pulvérisateur et laisser sécher.
8. Nettoyer la couverture de plastique avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec pulvérisateur et laisser sécher.

Après l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
2. Placer les curettes et buses dans un contenant pour stérilisation à froid.
3. Après exérèse, enlever et jeter l'embout d'irrigation dans une poubelle prévue à cet effet.
4. Jeter l'eau dans la cuvette prévue à cet effet et nettoyer le bassin avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec pulvérisateur et laisser sécher.

5. Nettoyer la couverture de plastique avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec pulvérisateur et laisser sécher.
6. Dans la salle de traitement, retirer les gants selon la méthode apprise.
7. Se laver les mains selon la procédure apprise.
8. Retirer la protection faciale selon la méthode apprise.
9. Désinfecter la protection faciale avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec pulvérisateur et laisser sécher.
10. Se laver les mains selon la procédure apprise.
11. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
12. Se laver les mains selon la procédure apprise.
13. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

Une fois par deux semaines, nettoyer le contenant de collection et le tube pour éviter une croissance microbienne et le développement de mauvaises odeurs.

Pour ce faire :

1. Vider le contenu du contenant dans un évier en faisant couler l'eau.
2. Faire couler de l'eau dans le tube.
3. Nettoyer le contenant et le tube avec du savon.
4. Mettre du liquide de stérilisation dans le contenant prévu à cet effet.
5. Submerger le tube dans le liquide de stérilisation pendant six heures.
6. Après six heures de trempage, vider le liquide de stérilisation.
7. Rincer le tube et le contenant avec de l'eau.

FICHE 6

MESURE DES RÉFLEXES ACOUSTIQUES

Matériels de protection

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure enseignée.
2. Mettre les équipements de protection individuels requis selon la procédure.

Pendant l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante.
2. Mettre des gants et désinfecter la pincette permettant de prendre les embouts pour le test avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
3. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
4. Prendre un embout avec la pincette dans le coffret.
5. Déposer la pincette sur une lingette.
6. Placer l'embout sur la sonde.
7. Insérer l'embout dans un des C.A.E. de la personne.
8. Faire l'évaluation des réflexes acoustiques en stimulation ipsilatérale.
9. Selon le type d'appareil de mesure, choisir un autre embout selon la même procédure et le mettre sur l'écouteur controlatéral.
10. Faire évaluation des réflexes acoustiques en stimulation controlatérale.
11. Enlever les embouts à l'aide d'un papier mouchoir et jeter les embouts et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.

IMPORTANT

En présence d'écoulements visibles dans l'un des conduits auditifs externes ou écoulements récents rapportés par la personne testée, après avoir fait le test d'un côté

1. Détacher les deux embouts avec un papier mouchoir et jeter les embouts et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.
2. Choisir un embout à la fois, selon la procédure décrite plus haut.
3. Attachez ces nouveaux embouts sur la sonde et l'écouteur en controlatéral (lorsque c'est applicable).
4. Refaire les étapes de stimulation ipsilatérale et controlatérale.
5. Enlever les embouts à l'aide d'un papier mouchoir et jeter les embouts et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.

Après l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
2. Mettre des gants et désinfecter la sonde et l'immitancemètre à l'aide d'une lingette alcoolisée à au moins 70%.

3. Désinfecter les surfaces touchées par la personne avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.
4. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
5. Se laver les mains selon la procédure apprise.
6. Retirer la protection faciale.
7. Désinfecter la protection faciale avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.
8. Se laver les mains selon la procédure apprise.
9. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
10. Se laver les mains selon la procédure apprise.
11. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 7

EXAMENS TONAUX

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédures

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Mettre un masque selon la procédure.
3. Mettre la protection faciale.
4. Mettre des gants et désinfecter les écouteurs et le fil avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
5. Désinfecter le clavier et la souris de l'ordinateur ou les divers boutons de l'audiomètre ainsi que le microphone avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
6. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.

Pendant l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante.
2. Demander à la personne testée de s'asseoir.
3. Donner les instructions à la personne relatives au test. Ne pas donner le bouton-réponse à la personne. Demandez-lui plutôt de lever la main pour répondre.

Conduction aérienne avec écouteurs INTRA-AURICULAIRES

1. Mettre des gants et désinfecter la pincette permettant de prendre les embouts pour le test avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
2. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
3. Prendre un embout avec la pincette dans le sac.
4. Déposer la pincette sur une lingette.
5. Insérer l'embout sur le raccord tubulaire de l'écouteur.
6. Bien écraser l'embout de mousse entre les doigts avant de l'introduire dans le conduit auditif externe (CAE).
7. Placer l'écouteur dans le CAE.
8. Refaire les actions 3, 4, 5 et 6 pour l'autre écouteur.
9. Durant l'examen, si vous devez sortir l'embout et le replacer, détacher l'embout avec un papier mouchoir et le jeter dans une poubelle prévue à cet effet. Attacher un nouvel embout au bout de raccord tubulaire de l'écouteur. Placer l'écouteur dans le CAE.

Note : S'il y a un écoulement provenant du CAE, vous devez mettre des gants avant d'enlever l'embout du raccord tubulaire de l'écouteur avec un papier mouchoir. Jeter les embouts et le papier mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet. Enlever les gants et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.

9. Quitter la cabine et faire le test

Conduction aérienne avec écouteurs SUPRA-AURICULAIRES (TDH)

1. Mettre des gants et désinfecter les coussinets des écouteurs avec une lingette alcoolisée à au moins 70% ou mettre un filet de protection.
2. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
3. Placer les écouteurs sur les oreilles de la personne testée.
4. Procéder à l'évaluation auditive tonale sans utilisation du bouton de réponse.
5. Retirer les écouteurs.

Conduction osseuse avec ossivibrateur

1. Mettre des gants et désinfecter l'ossivibrateur avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
2. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
3. Placer l'ossivibrateur sur la mastoïde.
4. Procéder à l'évaluation tonale sans utilisation du bouton de réponse.
5. Enlever l'ossivibrateur.

Après l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
2. Si des écouteurs intra-auriculaires ont été utilisés, détacher les embouts avec un papier mouchoir.
3. Jeter les embouts dans une poubelle prévue à cet effet.
4. Se laver les mains selon la procédure apprise.
5. Mettre des gants et désinfecter à l'aide d'une lingette alcoolisée à au moins 70%
 - a. Coussinets des écouteurs supra-auriculaires,
 - b. Ossivibrateur,
 - c. Panneau de contrôle de l'audiomètre,
 - d. Clavier de l'ordinateur,
 - e. Souris de l'ordinateur.
6. Laver les surfaces touchées par la personne testée avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.
7. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
8. Se laver les mains selon la procédure apprise.
9. Retirer la protection faciale.
10. Désinfecter la protection faciale avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
11. Se laver les mains selon la procédure apprise.
12. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
13. Se laver les mains selon la procédure apprise.
14. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 8 EXAMENS VOCAUX

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure enseignée.
2. Mettre les équipements de protection individuels requis en suivant la procédure enseignée.
3. Mettre des gants avant de nettoyer les équipements nécessaires à ce test avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
4. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.

Pendant l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante.
2. Demander à la personne testée de s'asseoir.
3. Donner les instructions à la personne relatives au test. Ne pas donner le bouton-réponse à la personne. Demandez-lui plutôt de lever la main pour répondre.

Écouteurs INTRA-AURICULAIRES

1. Mettre des gants et désinfecter la pincette permettant de prendre les embouts pour le test avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
2. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
3. Prendre un embout avec la pincette dans le sac.
4. Déposer la pincette sur une lingette.
5. Insérer l'embout sur le raccord tubulaire de l'écouteur.
6. Bien écraser l'embout de mousse entre les doigts avant de l'introduire dans le conduit auditif externe (CAE).
7. Placer l'écouteur dans le CAE.
8. Refaire les actions 3, 4, 5 et 6 pour l'autre écouteur.
9. Durant l'examen, si vous devez sortir l'embout et le replacer, détacher l'embout avec un papier mouchoir et le jeter dans une poubelle prévue à cet effet. Attacher un nouvel embout au bout de raccord tubulaire de l'écouteur. Placer l'écouteur dans le CAE.

Note : S'il y a un écoulement provenant du CAE, vous devez mettre des gants avant d'enlever l'embout du raccord tubulaire de l'écouteur avec un papier mouchoir. Jeter les embouts et le papier mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet. Enlever les gants et les jeter une poubelle prévue à cet effet.

9. Quitter la cabine et faire le test.

Écouteurs SUPRA-AURICULAIRES (TDH)

1. Mettre des gants et désinfecter les coussinets des écouteurs avec une lingette alcoolisée à au moins 70% ou mettre un filet de protection.
2. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
3. Placer les écouteurs sur les oreilles de la personne testée.
4. Procéder à l'évaluation auditive tonale sans utilisation du bouton de réponse.
5. Retirer les écouteurs.

Après l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
2. Si des écouteurs intra-auriculaires ont été utilisés, détacher les embouts avec un papier mouchoir.
3. Jeter les embouts dans une poubelle prévue à cet effet.
4. Se laver les mains selon la procédure apprise.
5. Mettre des gants et désinfecter les équipements utilisés avec une lingette alcoolisée à au moins 70%:
 - a. Coussinets des écouteurs supra-auriculaires,
 - b. Panneau de contrôle de l'audiomètre,
 - c. Clavier de l'ordinateur,
 - d. Souris de l'ordinateur.
6. Laver les surfaces touchées par la personne testée avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.
7. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
8. Se laver les mains selon la procédure apprise.
9. Retirer la protection faciale.
10. Désinfecter la protection faciale avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.
11. Se laver les mains selon la procédure apprise.
12. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
13. Se laver les mains selon la procédure apprise.
14. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 9

MESURES DES ÉMISSIONS OTOACOUSTIQUES

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Mettre les équipements de protection individuels selon la procédure.
3. Mettre des gants et désinfecter la sonde avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
4. Désinfecter le clavier et la souris de l'ordinateur avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
5. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.

Pendant l'examen

1. Avant d'entrer dans la salle, demander à la personne de se désinfecter les mains avec une solution désinfectante.
2. Demander à la personne testée de s'asseoir.
3. Mettre des gants et désinfecter la pincette permettant de prendre des embouts pour le test une lingette alcoolisée à au moins 70%.
4. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
5. Prendre un embout avec la pincette dans le coffret.
6. Déposer la pincette sur une lingette.
7. Insérer l'embout sur la sonde.
8. Si l'embout n'est pas le bon ou s'il y a présence de cérumen sur l'embout après avoir testé la première oreille, il faut l'enlever et le jeter dans une poubelle prévue à cet effet et en choisir un autre avec la pincette. Répéter cette procédure à chaque fois qu'il faut prendre un nouvel embout dans le coffret.
9. Faire les mesures.
10. Enlever le bouchon avec un mouchoir et le jeter dans la poubelle prévue à cet effet.

IMPORTANT

En présence d'un écoulement visible dans l'un des conduits auditifs externes ou d'un écoulement récent rapporté par la personne testée

1. Faire la mesure seulement l'oreille qui ne présente pas d'écoulement.
2. Détacher l'embout à l'aide d'un papier mouchoir.
3. Jeter l'embout dans une poubelle prévue à cet effet.

Après l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
2. Se laver les mains selon la procédure apprise.

3. Désinfecter les surfaces touchées par la personne testée et les surfaces touchées par l'expérimentateur avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
4. Mettre des gants et désinfecter à l'aide d'une lingette alcoolisée à au moins 70% :
 - a. La sonde,
 - b. Le clavier et la souris de l'ordinateur.
5. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
6. Se laver les mains selon la procédure.
7. Enlever la protection faciale selon la procédure apprise.
8. Désinfecter la protection faciale avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
9. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
10. Se laver les mains selon la procédure apprise.
11. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 10

MESURES ÉLECTROPHYSIOLOGIQUES

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédures

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Mettre les équipements de protection selon la procédure apprise.
3. Mettre des gants et désinfecter les écouteurs et le fil avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
4. Désinfecter la boîte tête avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
5. Désinfecter les fils servant à brancher les électrodes avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
6. Désinfecter la bouteille contenant la pâte abrasive servant à nettoyer la peau (NuPrep) avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
7. Désinfecter le clavier et la souris de l'ordinateur avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
8. Désinfecter la chaise de l'évaluateur et celle de la personne testée avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
9. Mettre en fonction l'ordinateur, ouvrir le logiciel des mesures électrophysiologiques, entrer les données relatives à la personne testée et mettre les paramètres du protocole de mesure pour être prêt à commencer les mesures.
10. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.

Pendant l'examen

1. Demander à la personne de se laver les mains selon la procédure.
2. Demander à la personne testée de s'asseoir à l'endroit désigné.
3. Donner à la personne instructions relatives au test.
4. Mettre des gants et désinfecter la pincette permettant de prendre les électrodes dans le sachet avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
5. Prendre les électrodes jetables nécessaires avec la pincette dans le sachet et les déposer sur une surface désinfectée.
6. Prendre les embouts pour écouteurs intra-auriculaires avec la pincette dans le sachet et les déposer sur une surface désinfectée.
7. Déposer la pincette sur une lingette.
8. Préparer la peau avec la pâte abrasive.
9. Placer les électrodes à l'endroit prévue.
10. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
11. Insérer l'embout sur le raccord tubulaire de l'écouteur.
12. Bien écraser l'embout de mousse entre les doigts avant de l'introduire dans le conduit auditif externe (CAE).

13. Placer les embouts de l'écouteur dans le CAE de chaque oreille.
14. Faire le test.

Notes :

- Si durant l'examen, vous devez sortir l'embout et le replacer, détacher l'embout avec un papier mouchoir et jeter l'embout et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet. Si durant l'examen, vous devez repositionner l'embout dans le conduit, le retirer, écraser le de nouveau avec un mouchoir, le replacer dans l'oreille et jeter le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.
- Si durant l'examen, vous devez retirer l'embout du conduit et le remplacer, le détacher avec un papier mouchoir et jeter l'embout et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.
- Se laver les mains selon la procédure apprise.
- S'il y a un écoulement provenant du conduit auditif externe, vous devez mettre des gants avant d'enlever l'embout du raccord tubulaire de l'écouteur avec un papier mouchoir. Jeter l'embout et le papier mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet. Enlever les gants et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
- Si durant l'examen vous deviez repositionner une électrode ou changer une électrode, retirer l'électrode du connecteur avec un mouchoir et jeter l'électrode et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.
- Suivre la procédure décrite plus haut pour remettre une nouvelle électrode.
- Si durant l'examen vous deviez nettoyer à nouveau la peau du patient avec la pâte abrasive, mettre des gants, retirer l'électrode de la peau avec un mouchoir, nettoyer la peau avec la pâte abrasive, repositionner l'électrode. Jeter les gants dans une poubelle prévue à cet effet.

Après l'examen

1. Enlever les écouteurs.
2. Détacher les embouts avec un papier mouchoir.
3. Jeter les embouts et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.
4. Mettre des gants et enlever les électrodes.
5. Jeter les électrodes dans une poubelle prévue à cet effet.
6. Demander à la personne testée de se laver la peau avec un coton imbibé d'alcool aux endroits où les électrodes ont été placées afin d'enlever le gel.
7. Demander à la personne de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
8. Procéder au repérage des ondes électrophysiologiques.
9. Sauvegarder les données selon la procédure enseignée dans le cours.
10. Désinfecter les surfaces touchées par la personne testée avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher
11. Désinfecter les écouteurs et le fil avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
12. Désinfecter la boîte tête avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
13. Désinfecter les fils servant à brancher les électrodes avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
14. Désinfecter la bouteille contenant de la pâte abrasive servant à nettoyer la peau (NuPrep).
15. Désinfecter le clavier et la souris de l'ordinateur avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.

16. Désinfecter la chaise de l'évaluateur avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
17. Enlever les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
18. Se laver les mains selon la procédure apprise.
19. Enlever la protection faciale selon la procédure apprise.
20. Désinfecter la protection faciale avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
21. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
22. Se laver les mains selon la procédure apprise.
23. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 11

PRISE D'EMPREINTES DU CONDUIT AUDITIF EXTERNE (C.A.E.)

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédures

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure enseignée.
2. Mettre les équipements de protection individuels requis selon la procédure.

Pendant l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante.
2. Désinfecter l'otoscope à l'aide d'une lingette alcoolisée à au moins 70%.
3. Prendre un spéculum du distributeur.
4. Attacher le spéculum sur l'otoscope ou vidéo-otoscope.
5. Faire l'examen des deux C.A.E.
6. Détacher le spéculum à l'aide d'un papier mouchoir et jeter le spéculum et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.
7. Désinfecter le pousse otobloc avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
8. Placer l'otobloc dans le C.A.E. à l'aide du pousse otobloc.
9. Désinfecter le fusil d'injection et sa canule avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
10. Préparer le fusil d'injection.
11. Attacher la canule sur le fusil d'injection.
12. Injecter le silicone dans le C.A.E. selon la procédure apprise.
13. Déposer le fusil d'injection à l'endroit prévu sur la table de travail.
14. Retirer l'empreinte du C.A.E.
15. Remettre un spéculum sur l'otoscope ou vidéo-otoscope.
16. Refaire l'examen des deux C.A.E.
17. Détacher le spéculum à l'aide d'un papier mouchoir et jeter le spéculum et le mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet.
18. Mettre les empreintes dans la boîte désignée à cet effet.

Après l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
2. À l'aide d'une lingette alcoolisée à au moins 70%, désinfecter :
 - a. Le manche de l'otoscope ou du vidéo-otoscope,
 - b. Le pousse otobloc,
 - c. Le fusil d'injection.
3. Désinfecter les surfaces touchées par le patient avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
4. Jeter les canules dans une poubelle prévue à cet effet.

5. Dans la salle de traitement, retirer les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
6. Se laver les mains selon la procédure apprise.
7. Retirer la protection faciale.
8. Désinfecter la protection faciale avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
9. Se laver les mains selon la procédure apprise.
10. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
11. Se laver les mains selon la procédure apprise.
12. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 12

TEST D'ÉCOUTE D'UNE AIDE AUDITIVE

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

N.B. : Ce test se fait en l'absence de la personne

Avant l'examen

1. Mettre le masque
2. Mettre gants selon la procédure apprise.

Pendant l'examen

1. Demander à la personne de se laver les mains avec une solution désinfectante
2. Demander à la personne de déposer l'aide auditive dans un contenant prévu à cet effet.
3. Désinfecter l'aide auditive avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
4. Désinfecter le stéthoscope qui servira au test d'écoute avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
5. Procéder au test d'écoute selon les méthodes enseignées.
6. Désinfecter l'aide auditive avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
7. Désinfecter un contenant avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
8. Placer l'aide auditive dans ce contenant.
9. Demander à la personne de reprendre son aide auditive.

Après l'examen

1. Demander à la personne de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
2. Désinfecter le stéthoscope.
3. Dans la salle de traitement, retirer les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
4. Se laver les mains selon la procédure apprise.
5. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
6. Se laver les mains selon la procédure apprise.
7. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 13

MESURES IN-SITU D'UNE AIDE AUDITIVE

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Mettre les équipements de protection requis.
3. Mettre les gants et désinfecter l'équipement avec une lingette alcoolisée à au moins 70% :
 - a. Porte-sonde
 - b. Clavier de la boîte de mesures
 - c. Souris
 - d. Interface NOAH
 - e. Fils
4. S'il y a utilisation d'un ordinateur pour programmation de l'aide auditive, désinfecter l'équipement avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
 - a. Clavier ordinateur
 - b. Souris

Pendant l'examen

1. Demander à la personne de se laver les mains avec une solution désinfectante.
2. Demander à la personne de déposer l'aide auditive dans un contenant.
3. Prendre l'aide auditive avec une lingette alcoolisée à au moins 70% et la désinfecter.
4. Procéder aux mesures in-situ de l'aide auditive en suivant la procédure apprise.
5. Désinfecter un contenant avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.
6. Déposer l'aide auditive dans ce contenant.
7. Demander à la personne de prendre l'aide auditive.

Après l'examen

1. Demander à la personne de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
2. Jeter la sonde de mesure dans une poubelle prévue à cet effet.
3. Désinfecter les équipements suivants avec une lingette :
 - a. Porte-sonde
 - b. Clavier de la boîte de mesures
 - c. Souris
 - d. Interface NOAH
 - e. Fils
4. S'il y a utilisation d'un ordinateur pour programmation de l'aide auditive, désinfecter les équipements suivants avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
 - a. Clavier ordinateur

b. Souris

5. Dans la salle de traitement, retirer les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
6. Se laver les mains selon la procédure apprise.
7. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
8. Se laver les mains selon la procédure apprise.
9. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 14

EXPERTISE ÉLECTROACOUSTIQUE DES APPAREILS AUDITIFS

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Note : Cette expertise se fait en l'absence de la personne

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Mettre les équipements de protection requis.

Pendant l'examen

1. Faire déposer l'aide auditive par la personne dans un contenant prévu à cet effet
2. Désinfecter l'aide auditive avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
3. Procéder à l'expertise électroacoustique de l'aide auditive.
4. Désinfecter l'aide auditive avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
5. Désinfecter un contenant avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
6. Placer l'aide auditive dans ce contenant.
7. Demander à la personne de reprendre son aide auditive.

Après l'examen

1. S'il y a utilisation d'une gommette pour le couplage de l'aide auditive au tube, jeter celle-ci dans une poubelle prévue à cet effet.
2. Désinfecter tous les composants de l'équipement avec une lingette alcoolisée à au moins 70% :
 - a. Coupleur
 - b. Microphone
 - c. Support
 - d. Fermeur
 - e. Clavier
 - f. Souris
3. Dans la salle de traitement, retirer les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
4. Se laver les mains selon la procédure apprise.
5. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
6. Se laver les mains selon la procédure apprise.
7. Mettre votre couvre-visage avant de quitter.

FICHE 15

EXAMEN VIDEONYSTAGMOGRAPHY (VNG)

Équipement de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure
- Visière faciale ou lunettes de protection

Important

Puisque la méthode d'enregistrement nécessite le port de lunettes infra-rouge, il n'est pas possible pour la personne testée de porter une protection oculaire usuelle durant l'enregistrement. Puisque nous sommes dans un contexte d'apprentissage, nous mettons tout en œuvre pour rendre l'activité possible et sécuritaire. L'expérimentateur aura l'ensemble des EPI requis. La personne testée aura un masque et les lunettes infra-rouge, fermées complètement (bande de caoutchouc autour du visage et caméra et bloqueur obstruant complètement les ouvertures des yeux) minimisant l'exposition oculaire.

- Blouse de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Mettre l'équipement de protection selon la procédure.
3. Laver l'élastique et le cadre de la lunette avec une lingette alcoolisée à au moins 70%. **Ne pas laver la lentille.**
4. Désinfecter le manche de l'irrigateur avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.

Durant l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante.
2. Procéder à l'enregistrement des différentes réponses.
3. Lors de l'enregistrement des tests visuels, l'expérimentateur est à l'ordinateur à distance de la personne testée.
4. Lors de la stimulation calorique
 - a. Avant la stimulation
 - i. Donner un sac de papier prévu pour récupérer les vomissements au cas où la personne en aurait besoin.
 - b. Indiquer à la personne qu'elle peut demander l'arrêt de la stimulation à tout moment.
 - c. Faire la stimulation.
5. Après la stimulation, pendant l'enregistrement de la réponse, retourner à l'ordinateur situé à distance de deux mètres.

Après l'examen

1. Enregistrer les données.
2. Retirer la lunette infra-rouge, les débrancher et les déposer dans un contenant.
3. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.

4. Jeter le spéculum utilisé pour la stimulation calorique dans une poubelle prévue à cet effet.
5. À l'aide d'une lingette alcoolisée à au moins 70%, désinfecter :
 - a. L'élastique et le cadre des lunettes infra-rouge
 - b. Le manche de l'irrigateur.
6. Désinfecter les surfaces touchées par la personne testée avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.
7. Retirer les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
8. Retirer la blouse de protection selon la procédure apprise et la jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
9. Se laver les mains selon la procédure apprise.
10. Retirer ses lunettes de protection selon la procédure.
11. Laver ses lunettes de protection avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.
12. Se laver les mains selon la procédure apprise
13. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
14. Se laver les mains selon la procédure apprise.
15. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 16

EXAMEN VIDEO HEAD IMPULSE TEST (VHIT)

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection

Important

Puisque la méthode d'enregistrement nécessite que la personne testée porte des lunettes infra-rouge, il n'est pas possible pour cette personne de porter une protection oculaire usuelle durant l'enregistrement. Bien que l'expérimentateur se situera à l'arrière, mais à moins de deux mètres de la personne testée pour la durée du test, il devra porter les équipements de protection individuels requis. Quant à la personne testée, elle aura un masque et les lunettes infra-rouge.

- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Mettre l'équipement de protection selon la procédure apprise.
3. Laver l'élastique et le cadre de la lunette avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
4. Laver les lentilles avec de l'eau chaude et du savon en frottant avec une boule de coton. **Il est important de ne pas laver les lentilles avec un désinfectant en raison de l'enduit qui les recouvre, permettant l'enregistrement infra-rouge.**
5. Après lavage, rincer et assécher avec une lingette en microfibre.
6. Installer la mousse protectrice sur les lunettes infra-rouge.

Durant l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante.
2. Procéder à l'enregistrement des différentes réponses.
3. Demeurer toujours à l'arrière du participant.

Après l'examen

1. Retirer les lunettes infra-rouge, les débrancher et les déposer dans un contenant.
2. Demander à la personne de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
3. Enregistrer les données.
4. Retirer la mousse protectrice des lunettes.
5. Jeter la mousse dans une poubelle prévue à cet effet puisqu'elle est à usage unique.
6. Laver l'élastique et le cadre de la lunette avec une lingette désinfectante.
7. Laver les lentilles avec de l'eau chaude et du savon en frottant avec une boule de coton. **Il est important de ne pas laver les lentilles avec un désinfectant en raison de l'enduit qui les recouvre, permettant l'enregistrement infra-rouge.**
8. Après lavage, rincer et assécher avec une lingette en microfibre.
9. Désinfecter les surfaces touchées par le patient à l'aide d'une lingette alcoolisée à au moins 70%.

10. Retirer les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
11. Se laver les mains selon la procédure apprise.
12. Retirer la protection faciale.
13. Désinfecter la protection faciale avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
14. Se laver les mains selon la procédure apprise.
15. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
16. Se laver les mains selon la procédure apprise.
17. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 17

EXAMEN VESTIBULAR EVOKED MYOGENIC (VEMP)

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Mettre l'équipement de protection selon la procédure apprise.
3. Préparer le matériel :
 - a. Désinfecter un contenant avec un liquide ayant au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
 - b. Sortir huit électrodes du sac à l'aide d'une pincette désinfectée avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
 - c. Sortir deux embouts pour les écouteurs intra-auriculaires à l'aide de la même pincette désinfectée.
4. Laver les fils d'électrodes, la boîte têtère et les fils des écouteurs à l'aide d'une lingette alcoolisée à au moins 70%.

Durant l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante.
2. Préparer la peau avec le produit désigné.
3. Installer les électrodes et les écouteurs.
4. Procéder à l'enregistrement des différentes réponses.
5. Lors de l'enregistrement, l'expérimentateur est à l'ordinateur qui est à distance de la personne testée.

Après l'examen

1. Retirer les embouts des écouteurs intra-auriculaires et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
2. Retirer les électrodes et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
3. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
4. Enregistrer les données.
5. Laver les fils d'électrodes, la boîte têtère et les fils des écouteurs à l'aide d'une lingette désinfectante.
6. Désinfecter les surfaces touchées par le patient avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
7. Retirer les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
8. Se laver les mains selon la procédure apprise.
9. Enlever la protection faciale selon la procédure apprise.
10. Désinfecter la protection faciale avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
11. Se laver les mains selon la procédure apprise.
12. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.

13. Se laver les mains selon la procédure apprise.
14. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 18

ÉVALUATION VESTIBULAIRE AU CHEVET

Équipement de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Lunettes de protection avec protections latérales

Note : La visière n'est pas adéquate pour certaines procédures (ex : *head impulse test*). Le port de lunettes de protection est requis. Dans le cas de personnes portant des lunettes de vision, il faudrait envisager la faisabilité avec la visière ou avoir des lunettes de protection adaptées.
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure.
2. Mettre l'équipement de protection selon la procédure.
3. Désinfecter la housse (tissu) du coussin (coussin pour un test en position debout) à l'aide d'une lingette alcoolisée à au moins 70%.
4. Laver le lit et la chaise à l'aide d'une lingette alcoolisée à au moins 70%.
5. Laver l'élastique et le cadre de la lunette infra-rouge avec une lingette alcoolisée à au moins 70%. **Ne pas laver la lentille.**

Durant l'examen

1. Procéder aux différentes méthodes.
2. Lorsque les lunettes infra-rouge sont requises :
 - a. Retirer les lunettes de protection;
 - b. Installer les lunettes infra-rouge. La lunette est fermée (bande caoutchouc autour du visage et les ouvertures pour les yeux sont obstrués complètement par la caméra et un bloc de plastique);
 - c. Faire la manœuvre et procéder à l'enregistrement des mesures.

Après l'examen

1. Retirer les lunettes infra-rouge au patient, les débrancher et les déposer dans un contenant.
2. Demander à la personne de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
3. À l'aide d'une lingette alcoolisée à au moins 70%, désinfecter :
 - a. La housse (tissu) du coussin (coussin pour un test en position debout)
 - b. Le lit et la chaise
 - c. L'élastique et le cadre des lunettes infra-rouge
4. Laver les surfaces touchées par le patient avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
5. Retirer les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
6. Se laver les mains selon la procédure apprise.
7. Retirer les lunettes de protection selon la procédure apprise.
8. Laver les lunettes de protection avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.

9. Se laver les mains selon la procédure apprise.
10. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
11. Se laver les mains selon la procédure apprise.
12. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 19

TESTS AU VPPB

Équipement de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Lunettes de protection

Important

Puisque la méthode d'enregistrement nécessite le port de lunettes infra-rouge, il n'est pas possible pour la personne testée de porter une protection oculaire usuelle durant l'enregistrement. Puisque nous sommes dans un contexte d'apprentissage, nous mettons tout en œuvre pour rendre l'activité possible et sécuritaire. L'expérimentateur aura l'ensemble des EPI requis. La personne testée aura un masque et les lunettes infra-rouge, fermées complètement (bande de caoutchouc autour du visage et caméra et bloqueur obstruant complètement les ouvertures des yeux) minimisant l'exposition oculaire.

- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure.
2. Mettre l'équipement de protection selon la procédure.
3. Laver l'élastique et le cadre de la lunette infra-rouge avec une lingette alcoolisée à au moins 70%. **Ne pas laver la lentille.**

Durant l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante.
2. Procéder aux différentes méthodes.

Après l'examen

1. Enregistrer les données.
2. Retirer les lunettes infra-rouge, les débrancher et les déposer dans un contenant.
3. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
4. Laver l'élastique et le cadre de la lunette avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
5. Laver le lit avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.
6. Laver les surfaces touchées par le patient avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.
7. Retirer les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
8. Se laver les mains selon la procédure apprise.
9. Retirer ses lunettes de protection selon la procédure.
10. Laver ses lunettes de protection avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec bec distributeur et laisser sécher.
11. Se laver les mains selon la procédure apprise.

12. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
13. Se laver les mains selon la procédure apprise.
14. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.

FICHE 20

MÉTHODES DE RÉADAPTATION VESTIBULAIRE

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Lunettes de protection avec protections latérales de préférence. Certains exercices pourraient être plus difficiles à effectuer avec une visière faciale.

Procédure

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure.
2. Mettre l'équipement de protection selon la procédure.
3. Désinfecter le matériel utilisé (ballon, marche pieds, housse du coussin, carte à jouer, crayon, chronomètre) avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
4. Laver le lit et la chaise avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.

Durant l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avec une solution hydroalcoolisée à 70%.
2. Procéder aux différentes méthodes.

Après l'examen

1. Demander à la personne testée de se laver les mains avant de quitter.
2. Désinfecter le matériel utilisé (ballon, marche pieds, housse du coussin, carte à jouer, crayon, chronomètre) avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
3. Laver les surfaces touchées par le patient avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
4. Se laver les mains selon la procédure apprise.
5. Retirer les lunettes de protection selon la procédure.
6. Laver les lunettes de protection avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
7. Se laver les mains selon la procédure apprise.
8. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
9. Se laver les mains selon la procédure apprise.
10. Mettre votre couvre-visage avant de quitter.

FICHE 21

ÉVALUATION AUDIOLOGIQUE D'ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE

Équipements de protection individuels

- Masque avec fenêtre ou de procédure, selon les indications en vigueur
- Visière faciale ou lunettes de protection
- Gants non stériles, bien ajustés, à usage unique

Procédures

Avant l'examen

1. Se laver les mains selon la procédure apprise.
2. Mettre les équipements de protection selon la procédure apprise.
3. Mettre les gants et désinfecter les écouteurs et le fil avec une lingette alcoolisée à au moins 70%, s'il est planifié de les utiliser.
4. S'ils sont utilisés, désinfecter le clavier et la souris de l'ordinateur, les divers boutons de l'audiomètre, les disques CD, le lecteur de CD, les écouteurs et le microphone de l'évaluateur à l'audiomètre et l'écouteur de l'évaluateur se trouvant dans la cabine avec l'enfant et le parent avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
5. Désinfecter la chaise où l'accompagnateur du bébé sera assis, s'il s'agit d'une évaluation avec les renforçateurs visuels, avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
6. Désinfecter la table et les chaises ou la chaise haute qui serviront lors de l'évaluation d'un enfant entre deux et quatre ans avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
7. Désinfecter les jouets qui serviront à l'évaluation avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
8. Si les écouteurs intraauriculaires sont utilisés, désinfecter la pincette permettant de prendre les embouts pour le test avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
9. Retirer les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.

Pendant l'examen

1. Demander à la personne qui accompagne le bébé ou l'enfant de se laver les mains avec une solution désinfectante ainsi que celle de son enfant.
2. Demander à la personne de s'asseoir à l'endroit désigné.
3. Asseoir le bébé ou l'enfant à l'endroit désigné.
4. L'évaluateur qui reste dans la cabine donne les instructions relatives au test.
5. Prendre un embout avec la pincette dans le sachet.
6. Déposer la pincette sur une lingette.
7. Insérer l'embout sur le raccord tubulaire de l'écouteur.
8. Écraser l'embout entre les doigts à l'aide d'un mouchoir.
9. Placer l'embout de l'écouteur dans le conduit auditif externe.
10. Refaire les actions 5, 6, 7, 8 et 9 pour l'autre écouteur.

11. Si durant l'examen, vous devez sortir l'embout et le replacer, détacher l'embout avec un papier mouchoir et le jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
12. Attacher un nouvel embout au bout du raccord tubulaire de plastique de l'écouteur.
13. Placer l'embout de l'écouteur dans le conduit auditif externe.

Note :

S'il y a un écoulement provenant du conduit auditif externe, vous devez mettre des gants avant d'enlever l'embout du bout de raccord tubulaire de plastique de l'écouteur avec un papier mouchoir. Jeter les embouts et le papier mouchoir dans une poubelle prévue à cet effet. Enlever les gants et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.

14. Un évaluateur reste dans la cabine et se place à l'endroit désigné. L'autre évaluateur est à l'audiomètre et commence le test.

Après l'examen

1. Enlever les écouteurs, le cas échéant.
2. Demander à la personne accompagnatrice de laver les mains du bébé ou de l'enfant et de se laver les mains avec une solution désinfectante avant de quitter.
3. Détacher les embouts avec un papier mouchoir, le cas échéant.
4. Jeter les embouts dans une poubelle prévue à cet effet.
5. Se laver les mains selon la procédure apprise.
6. Mettre des gants
7. Désinfecter les surfaces touchées par la personne accompagnatrice et l'enfant, avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
8. Désinfecter les écouteurs et le fil une lingette alcoolisée à au moins 70%, le cas échéant.
9. Fermer la porte de la cabine pendant au moins 15 minutes afin de permettre un rafraîchissement de l'air à partir du système de ventilation.
10. S'ils sont utilisés, désinfecter le clavier et la souris de l'ordinateur, les divers boutons de l'audiomètre, les disques CD, le lecteur de CD, les écouteurs et le microphone de l'évaluateur à l'audiomètre et l'écouteur de l'évaluateur se trouvant dans la cabine avec l'enfant et le parent avec une lingette alcoolisée à au moins 70%.
11. Désinfecter les surfaces touchées par l'évaluateur.
12. Retirer les gants selon la procédure apprise et les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.
13. Se laver les mains selon la procédure apprise.
14. Enlever la protection faciale selon la procédure apprise.
15. Désinfecter la protection faciale avec un liquide désinfectant à au moins 70% d'éthanol contenu dans une bouteille avec un bec distributeur et laisser sécher.
15. Se laver les mains selon la procédure apprise.
16. Lorsque vous êtes à votre casier, retirer le masque avec visière selon la procédure et le mettre dans le sac prévu à cet effet pour le transporter à votre domicile. Si c'est un masque de procédure, le jeter à la poubelle.
17. Se laver les mains selon la procédure apprise.
16. Mettre votre masque de procédure avant de quitter.